




ПЕРЕНОС ОДИНМ СПАСАТЕЛЕМ



Лямка обхватывает левое плечо спасателя и правое плечо и плечо, видящим, правое бедро пострадавшего

На лямке



Спереди



На спине



Волоком



На плече при бессознательном состоянии пострадавшего



НОСИЛКИ ИЗ ПОДРУЧНЫХ СРЕДСТВ



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НОСИЛКОВ

УКЛАДЫВАЮТ ПОСТРАДАВШЕГО НА НОСИЛКИ два спасателя. Носилки выставляют справа от пострадавшего. Оба спасателя опускаются на колени - первый на уровне плеч, второй у колени пострадавшего.



Первый спасатель левой рукой захватывает грудь пострадавшего, а правой фиксирует голову. Второй спасатель левой рукой захватывает голени пострадавшего сверху, а правой его бедро снизу. По команде первого спасателя осторожно поднимите пострадавшего на уровень носилок, а затем по второй команде опустите на них.

Если пострадавший в тяжелом состоянии, его переносят головой вперед. Тогда третий спасатель (медицинский работник) следит за состоянием пострадавшего и одновременно делает ему внутрисосудистое вливание соответствующих лечебных растворов.

Спасатели должны идти короткими шагами, не в ногу, избегая сотрясения носилок. Находящийся у головы спасатель контролирует состояние пострадавшего, повязки, шн, углов.



НОГАМИ ВПЕРЕД

Для облегчения используйте ремни или лямки, надеваемые на плечи спасателей



ГОЛОВОЙ ВПЕРЕД



ГОЛОВОЙ ВПЕРЕД



НОГАМИ ВПЕРЕД

По горизонтальной поверхности и при спуске, например по лестнице, переносите пострадавшего ногами вперед, а при подъеме - головой вперед.

ПЕРЕНОС ДВУМЯ СПАСАТЕЛЯМИ

На лямке друг за другом



Спасатели располагаются в затылок друг другу

На лямке рядом



Спасатели располагаются бок о бок

На замке из трех рук



Друг за другом



На шесте



САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ ПЕРЕДВИЖЕНИЕ пострадавшего при шоке (травматическом шоке), травмах головы, позвоночника, нижних конечностей, таза **ЗАПРЕЩЕНО**. Переносить его можно только после выведения из терминального состояния, восстановления устойчивого дыхания и пульса.

ПОВРЕЖДЕНИЕ	ПОЛОЖЕНИЕ НА НОСИЛКАХ
Ранения, шок, травмы нижних конечностей, травмы переднего и боковых отделов туловища. При переломах позвоночника - на шите	На спине горизонтально
Травмы головы, мозга, открытые переломы черепа, если сознание сохранено и симптомов шока нет	Голова приподнята
Открытый перелом черепа	Голова и туловище приподняты 10 - 15°
Тяжелый шок или угроза его развития	Ноги выше головы 10 - 15°
Массивные кровотечения, шок, угроза развития шока или клинической смерти	Ноги приподняты
Повреждение органов грудной полости, особенно при острой дыхательной недостаточности, травмы лица, глаз, челюстей, шеи, груди, переломы костей рук, если нет угрозы шока	Сидя или полусидя
Переломы костей таза, травмы живота	Голова на подушке, Валик под коленями и между ними, Фиксирующие лямки, Открыт зад, ступни
Переломы позвоночника с осколками или рваными ранами (на затылке), Ранения челюстей, носа, лица с кровотечением	Голова повернута на бок
После выведения из тяжелого шока, терминального состояния, при потере сознания	Лежа на боку