



ОЖОГИ, ОТРАВЛЕНИЯ, ОБМОРОЖЕНИЯ

ТЕРМИЧЕСКИЙ ОЖОГ

СИМПТОМЫ:
 I степень - боль, покраснение кожи, отек;
 II степень - боль, покраснение кожи, отек, пузыри;
 III степень - крупные пузыри с кровянистой жидкостью; серые или желтоватые струны (могут быть плотными, сморщенными);
 IV степень - коричневые или черные плотные струны, обезживающие кожу, мышцы, скелетные кости.

ЗАПРЕЩЕНО:
 • прикасаться к месту ожога;
 • прокалывать, вскрывать пузыри;
 • обрабатывать место ожога маслом, жиром, кремом, молем и т.д.



Быстро вынести пострадавшего из зоны пожара, снять с горячей одежды пластик, плотной материи, кошкой, паком, НЕ ДОПУСКАТЬ, чтобы человек в горячей одеждебежал.

Ветер раздувает пламя и усиливает ожог!

При ожоге I степени немедленно начать охлаждение места ожога водой (не менее 10 - 15 минут). Можно приложить лед.

Срезать ту часть обгоревшей одежды, которая отсланывается. Смыть ее нельзя. Если обгоревшая одежда прилипла к месту ожога, ее не удалают, и стерильную повязку накладывают на ожог.

Если обожженное лицо, поверхность на него накладывают сразу же.

Края обожженной кожи обработать спиртом, водой и т.д. и наложить стерильную повязку.

Если нет роты, дать пострадавшему обычное солевое питье:
 • 1 чайная ложка соли;
 • 1 литр воды.

ПРИ ТЯЖЕЛЫХ И ОБШИРНЫХ ОЖОГАХ ЗАВЕРНУТЬ ПОСТРАДАВШЕГО В ЧИСТУЮ ПРОСТИНЬЮ, УКРЫТЬ ПОТЕПЛЕЕ И СОЗДАТЬ ПОКОЙ В ОЖИДАНИИ ВРАЧА.



Ножницы - просто прилизовать?



Пить не менее двух стаканов в час



**ОТРАВЛЕНИЕ ПРОДУКТАМИ ГОРЕНИЯ,
а также природным газом, ацетиленом, парами бензина, угарным газом**



ПРИ ОТРАВЛЕНИИ ГАЗАМИ ИСКУССТВЕННУЮ ВЕНТИЛЯЦИЮ ЛЕГКИХ МОЖНО ПРОВОДИТЬ ТОЛЬКО ВНЕ ЗАРАЖЕННОЙ ЗОНЫ

ПРИ ОТРАВЛЕНИИ ХЛОРОМ
 Глаза, рот и нос пострадавшего промойте 2%-ным раствором соды. Одежду подвергнут дегазации. При кашле, одышке, посинении губ дайте пострадавшему искусственную подышку.

ПРИ ОТРАВЛЕНИИ АММИАКОМ
 Дать пострадавшему вдыхать теплые водяные пары (лучше с добавлением уксуса или нескольких кристаллов лимонной кислоты). Тщательно промыть глаза водой.

ПРИ ОТРАВЛЕНИИ ФТОРОСОДЕРЖАЩИМИ РЕАГЕНТАМИ
 Промойте желудок 2%-ным раствором соды и дайте выпить сок из винных желток и стакана молока.

ХИМИЧЕСКИЙ ОЖОГ КОЖИ
 Важно как можно быстрее уменьшить концентрацию химического вещества и временно его воздействия.

Разрежьте и удалите ядовитые щипцы. Пораженное место промойте большим количеством проточной холодной воды в течение 15 - 20 мин. Старитесь, чтобы отработанная вода не попадала на другие участки тела или на самого спасателя. Зону ожога обработайте нейтрализующими раствором (примочки), просушите тампоном или пилой и наложите стерильную повязку.

**НЕЙТРАЛИЗУЩИЕ РАСТВОРЫ
ПРИ ОЖОГАХ:**

- кислотами - 1 чайная ложка питьевой соды из стакан воды;
- щелочами - 1 чайная ложка борной кислоты из стакан воды или столовый уксус полопан с водой.

При попадании на кожу фторогеранических соединений обычно промойте ее 2 - 3%-ным раствором соды.

Растянуть обморожение места чем-либо, особенно скотом, погружать пораженные конечности в теплую воду, а также созывать врачом и машину НЕЛЬЗЯ!

Разогревается только отогревать обмороженное место пальми руки или делать теплой маской от периферии к туловищу. Массировать можно руками или скотом теплой ткани до появления розовой окраски кожи. На обмороженный участок тела наложить стерильную повязку с большими количествами ваты или влагалища, теплой одеждой. Следят за пострадавшим 1-2 таблетки аспирина или анальгина, а также горячий чай, кофе.

ОБМОРОЖЕНИЕ

СИМПТОМЫ:
 I степени
 Кожа бледная, скучная, потеряет чувствительность;
 II степени
 Омертвление поверхности слоев кожи; пузыри, наполненные прозрачной жидкостью;

III степени
 Омертвление всех слоев кожи и мягких тканей на различную глубину; пузыри наполнены темно-красной или бурой жидкостью;

IV степени
 Омертвление всех тканей в кости; пузыри с черной жидкостью.

ПРИ ЗНАЧИТЕЛЬНЫХ ОБМОРОЖЕНИЯХ НЕОБХОДИМА ГОСПИТАЛИЗАЦИЯ



ОБМОРОК

В предобморочном состоянии пострадавший впадает из анестезии головокружения, головные боли, ощущение невнятного дискомфорта, головные боли, судороги, бред, обморожение.

Вынести пострадавшего из заряженного помещения в прохладное место или удалить с солнца в тени. Уложить так, чтобы голова была выше туловища. Снимите с него варежки и перчатки, оберните простыней и обвязите холодной водой. На голову можно положить холдинг. Поне пострадавшему холдингом между ногами и под головой водой.

Когда температура тела пострадавшего снижается до 37°C, обливать прекращают и оберывают его сухой простыней.



ТЕПЛОВОЙ (СОЛНЕЧНЫЙ) УДАР

Производят прямой удар в мозг. Пострадавший чувствует слабость, раздражение, головную боль, тошноту, температура тела повышается до 40 - 42°C. Возникают потеря сознания, судороги, бред, обморожение.


Вынести пострадавшего из заряженного помещения в прохладное место или удалить с солнца в тени. Уложить так, чтобы голова была выше туловища. Снимите с него варежки и перчатки, оберните простыней и обвязите холодной водой. На голову можно положить холдинг. Поне пострадавшему холдингом между ногами и под головой водой.



ПОПАДАНИЕ ИНОРОДНОГО ТЕЛА В ГЛАЗ

Уложите пострадавшего, пальцами осторожно раздвиньте веки. Проверьте, нет ли повреждений в области проникновения ранения, зорищ, склер, глазничного аппарата, глазного яблока, под глазами, грызи. При проникновении ранения небольшую пилюлю, плотно прижмите ее к лицу и удалите иностранные тела и промойте глаза истекающим из глаза соком или сывороткой. После промывания удалите из глаза иностранные тела, наложите на глаз салфетку, затем пальзу и срочно обратитесь за медицинской помощью.

При удалении из глаза малых частиц (пыли) если проникающее ранение нет, промойте можно снять ванночку в чистом небольшом глазу с течение не менее 10 мин струей воды из сифона (например, рюмки), тесно скреплены пылью и фонтанчиком. Тереть глаза пальцами не следует.



ПРИ ОТРАВЛЕНИИ ФТОРОСОДЕРЖАЩИМИ РЕАГЕНТАМИ
 Промойте желудок 2%-ным раствором соды и дайте выпить сок из винных желток и стакана молока.

ХИМИЧЕСКИЙ ОЖОГ ГЛАЗ

Чистыми пальцами раздвиньте веки пострадавшего. Осторожно, стерильным тампоном удалите остатки химического вещества (без краевого обесцвечивания).

Обильно промойте глаза, не допуская, чтобы использованный водой попадал на другие части лица, на спасателя.

Наложите стерильную повязку и срочно госпитализируйте пострадавшего.

ХИМИЧЕСКИЙ ОЖОГ ПИЩЕВОДА

- немедленно вызовите врача;
- при рвоте дайте выпить не более 2 - 3 стаканов чистой воды;
- полезно пить молоко, кисломолочные продукты, кисломолочные кислоты и т.д.;

ОТРАВЛЕНИЕ ЯДАМИ, ХИМИЧЕСКИМИ ВЕЩЕСТВАМИ
 Действие спасателя:

- немедленно вызовите медицинскую помощь;
- при бессознательном состоянии уложить пострадавшего на бок; в случае клинической смерти окажите реанимационную помощь;
- при отравлении четыреххлористым углеродом, диоксираном, фенолом, бензином, эпихлоридом, нитроэтиленом, сантонином НЕЛЬЗЯ давать пострадавшему молоко, кисломолочные продукты и т.д.;
- рвотные массы соберите в полиэтиленовую сумку;
- обильно промойте желудок водой (10 - 15 л) с тщательно размешенным активированным углем (2 - 3 стакана ложек на стакан воды). Введите слабительный.

При попадании в пищевод щелочей или кислоты нельзя пытаться промыть желудок, вызвать рвоту или выдуть гидратирующими растворами.